

## **Yskäoirekysely** (valikoituja kysymyksiä Leicester Cough Questionnairesta)

YMPYRÖI tilanteeseesi parhaiten sopiva vastaus.

### **1. Onko sinulla ollut edeltävien 2 viikon aikana yskästä johtuvaa rinta- tai vatsakipua?**

1. Koko ajan
2. Valtaosan ajasta
3. Suuren osan ajasta
4. Osan ajasta
5. Pienen osan ajasta
6. Ei juuri koskaan
7. Ei koskaan

### **2. Onko sinua edeltävien 2 viikon aikana häirinnyt yskösten nousu yskimisen yhteydessä?**

1. Joka kerta
2. Useimmiten
3. Usein
4. Joskus
5. Silloin tällöin
6. Harvoin
7. Ei koskaan

### **3. Oletko ollut edeltävien 2 viikon aikana väsynyt yskäsi vuoksi?**

1. Koko ajan
2. Valtaosan ajasta
3. Suuren osan ajasta
4. Osan ajasta
5. Pienen osan ajasta
6. En juuri koskaan
7. En koskaan

### **4. Edeltävien 2 viikon aikana yskä on häirinnyt työtäni tai muita päivittäistoimiani.**

1. Koko ajan
2. Valtaosan ajasta
3. Suuren osan ajasta
4. Osan ajasta
5. Pienen osan ajasta
6. Ei juuri koskaan
7. Ei koskaan

### **5. Onko yskä häirinnyt untasi edeltävien 2 viikon aikana?**

1. Koko ajan
2. Valtaosan ajasta
3. Suuren osan ajasta
4. Osan ajasta
5. Pienen osan ajasta
6. Ei juuri koskaan
7. Ei koskaan

### **6. Montako kertaa päivässä sinulla on ollut yskänkohtauksia edeltävien 2 viikon aikana?**

1. Koko ajan (jatkuvasti)

2. Valtaosan päivästä
3. Useita kertoja päivän mittaan
4. Joitakin kertoja päivän mittaan
5. Silloin tällöin päivän mittaan
6. Harvoin
7. Ei lainkaan

**7. Edeltävien 2 viikon aikana yskimiseni on keskeyttänyt keskustelun tai puhelinkeskustelun.**

1. Joka kerta
2. Useimmilla kerroilla
3. Suuren osan ajasta
4. Osan ajasta
5. Pienen osan ajasta
6. Ei juuri koskaan
7. Ei koskaan